Важно: сверьтесь с данными инструкциями перед операцией или процедурой, назначенной Вам или Вашему ребенку!

Как подготовить себя или своего ребенка к операции или процедуре

Имейте при себе список всех применяемых лекарств, включая безрецептурные препараты. Можно также принести аптечные квитанции, фотографии упаковок или распечатанный врачом список.

В день операции/процедуры **на пациенте должны быть очки, а не контактные линзы.**

Заранее договоритесь о том, кто повезет пациента домой после выписки. **Проезд на общественном транспорте не рекомендуется.**

На пациенте не должно быть никакой косметики и лака для ногтей.

Снимите с пациента все ювелирные украшения, включая пирсинг.

В день операции или процедуры

- **Не рекомендуем брать в клинику других детей** в день операции/процедуры.
- **Согласие на операцию/процедуру** пациента младше 18 лет должно быть подписано родителем или опекуном.
- Пациенткам старше 12 лет необходимо сдать **анализ мочи**. Пациенткам до 12 лет, у которых уже была менструация, тоже нужно сдать анализ мочи. Это необходимо для теста на беременность.

Контакты

Клиника координации периоперационного ухода, Бостон

617-355-3765

Прибытие за 1,5 часа до процедуры

Дневной хирургический стационар, Бостон

617-355-7921

Прибытие за 1,5 часа до процедуры

Хирургический центр, Уолтем

781-216-1285

Прибытие за 1,5 часа до процедуры

Хирургический центр, Лексингтон

781-216-3000

Прибытие за 1 час до процедуры

Отделение гастроэнтерологических процедур, Бостон

617-355-6172

Отделение интервенционной радиологии, Бостон

07:30–16:30: 617-355-6579

Прибытие за 1,5 часа до процедуры

Отделение радиологии (МРТ, КТ, ядерная медицина)

08:00–18:00: 617-919-7226

Кардиологическая клиника предоперационной подготовки, Бостон

08:30–16:00: 617-355-6095

16:30–19:30: 617-355-0030

после 19:30: 617-355-6363 — попросите к телефону дежурного кардиолога

Отделение МРТ сердца, Бостон

08:00–16:00: 617-355-6024

16:00–19:30: 617-355-0032

после 19:30: 617-355-6363 — попросите к телефону дежурного кардиолога

Руководство по воздержанию от пищи и питья перед операцией или процедурой

Подготовка к операции/процедуре

Boston Children's Hospital

Where the world comes for answers

617-355-6000
617-730-0152 (телетайп)
www.childrenshospital.org

Воздержание от пищи и питья

Перед операцией или процедурой пациенту необходимо заблаговременно прекратить прием пищи и жидкости. **Внимательно изучите и выполните данные указания, чтобы правильно подготовиться.**

Почему пациенту нельзя есть или пить перед операцией/процедурой?

Это необходимо для безопасности пациента во время операции или процедуры. Еда и питье — жидкости, твердая пища и грудное молоко — накапливаются в желудке. Когда пациент уснет, пища и жидкости могут из желудка попасть в легкие. Это может привести к пневмонии.

Поскольку разные виды пищи проходят через желудок с неодинаковой скоростью, необходимо строго соблюдать данные указания перед операцией или процедурой.

Что произойдет, если пациент съест или выпьет что-нибудь после указанного крайнего времени?

Если пациент съест или выпьет что-нибудь после указанного крайнего времени, **операцию или процедуру, возможно, придется перенести или отменить.**

Что считается прозрачной жидкостью?

Пациенту можно пить прозрачные жидкости вплоть до **1 часа** перед процедурой или обследованием.

К прозрачным жидкостям относятся:

- чистая вода;
- вода с глюкозой;
- яблочный сок (не сидр!);
- прозрачный педиалайт;
- допускаются прозрачные газированные напитки.

Крайние сроки прекращения приема пищи и питья

- × Прием твердой пищи и молока следует прекратить в **полночь** перед операцией/процедурой
- × Кормление любыми детскими смесями следует прекратить **за 6 часов** до операции/процедуры
- × Грудное кормление следует прекратить **за 4 часа** до операции/процедуры
- × Прием прозрачных жидкостей следует прекратить **за 1 час** до операции/процедуры

Кормление любыми детскими смесями с загустителями, включая *Simply Thick или Thick-It,* следует прекратить **за 6 часов** до операции.

Крайние сроки прекращения приема пищи и питья для детей с гастростомической трубкой

- × Кормление любыми детскими смесями следует прекратить **за 6 часов** до операции/процедуры
- × Прием прозрачных жидкостей следует прекратить **за 1 час** до операции/процедуры

Для пациентов клиники Уолтем

Дату и время операции/процедуры, назначенной Вам или Вашему ребенку, можно узнать в клинике по телефону на обороте брошюры.

Для всех остальных пациентов

Вам позвонят из клиники и сообщат дату и время назначенной операции/процедуры.

Заметки

Запишите здесь свои заметки или вопросы.

Редакция: 03.06.2022