



Puntos clave para recordar:


- **Asegúrese de que sabe usar el autoinyector de epinefrina de su niño** para estar preparado(a) en una emergencia. Si tiene preguntas sobre cómo usar este dispositivo, hable con el alergólogo o la enfermera de alergia.
- **Si su niño tiene síntomas de anafilaxia, use el autoinyector de epinefrina y llame de inmediato al 911.**

¿Qué es la anafilaxia?

- La anafilaxia es una reacción alérgica muy fuerte que puede afectar al cuerpo entero. **Es una emergencia médica.**
- La anafilaxia puede ocurrir pocos segundos o varias horas después de la exposición al alérgeno (la sustancia que causó la reacción).
 - La reacción alérgica suele ocurrir dentro de los primeros 30 minutos de la exposición al alérgeno.
- La anafilaxia puede ser muy grave y a veces mortal.
- Pídale a su alergólogo un plan de acción escrito para emergencias.
- Si es posible, lo mejor es alejarse del alérgeno.
- También es una buena idea usar un brazalete de alerta médica.

¿Cuáles son los síntomas?

Algunos de los síntomas son:



Si su niño tiene síntomas de anafilaxia, use el autoinyector de epinefrina y llame de inmediato al 911.

¿Qué es el autoinyector de epinefrina?

- El autoinyector de epinefrina es un dispositivo que administra una (1) dosis de epinefrina, también conocida como adrenalina.
- Es importante que hable con su profesional de la salud acerca de cuándo usarlo.

¿Qué debo saber acerca del uso de los autoinyectores de epinefrina?

- Tenga suficientes autoinyectores de epinefrina a la mano para que haya siempre al menos 2 con usted o con su niño.
- No guarde autoinyectores de epinefrina en lugares muy calurosos o fríos, por ejemplo, en el automóvil o en la guantera. Esto podría impedir que el dispositivo funcione.

¿Qué medicamento contiene el autoinyector de epinefrina?

El medicamento se llama epinefrina. Actúa rápidamente para revertir los síntomas de anafilaxia o reacción alérgica. Aumenta la frecuencia cardíaca (el ritmo del corazón) y la presión arterial, facilita la respiración y reduce la hinchazón alrededor de los labios, la cara y las vías respiratorias. Algunos de los efectos secundarios son:

- Latido rápido o agitado del corazón, sudores, ansiedad
- Mareos
- Dolor de cabeza

¿Cómo debo usar mi autoinyector de epinefrina?

Auvi-Q

- Sitio web: www.auvi-q.com
- Instrucciones paso a paso para el uso del dispositivo: <http://bit.ly/2DxqdOb>

AdrenaClick

- Sitio web: www.adrenaClick.com
- Instrucciones paso a paso para el uso del dispositivo: <http://bit.ly/2piqEXG>

Epipen

- Sitio web: www.epipen.com
- Instrucciones paso a paso para el uso del dispositivo: <http://bit.ly/2tXp4Aa>

Comuníquese con nosotros

- **De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.:** Llame al Programa de Alergia al 617-355-6117.
- **Después de las 4:30 p.m. o en fines de semana y días feriados:** Llame al 617-355-6369 y pida hablar con el alergólogo de turno.